

第 20 期福井糖尿病療養指導担当者教育講習会 6 月講義施行ミニテスト

解答は解答用紙に記入してください。

以下の各文について、正しい文には○印、間違いのある文には×印を付けなさい。

- 1、先日ノーベル賞も授賞した新規抗癌薬、抗 PD-1 モノクローナル抗体(オプジーボ®)の使用にあたっては、副作用として 2 型糖尿病発症に留意する。
- 2、ビグアナイド薬による乳酸アシドーシスの大半は、使用をさけるべき症例へ投与された場合に出現する。
- 3、外科手術(緊急以外の待機手術)において、術前血糖コントロール目標は、最大でも空腹時血糖 \leq 140mg/dl もしくは食後血糖 \leq 200mg/dl とされ、HbA1c 値は問わない。
- 4、速効型インスリン分泌薬(ミチグリニド・ナテグリニドなど)は食直前に服用するが、食べ始めてから飲み忘れに気がついたら、その回は服薬を飛ばす。
- 5、新品のインスリンの使用を開始するときには、品質劣化を防ぐため、初回使用のできるだけ直前まで冷蔵庫に保管しておくのが望ましい。
- 6、低血糖症状には個人差があり、また、一人の患者でもときにより症状の出方はまちまちである。
- 7、海外旅行時、インスリンは必要量の 2 倍程度を用意して2つのパックに分散し、かさばっても必ず手荷物として機内持ち込みにする。
- 8、糖尿病患者では、唾液および歯肉溝液のグルコース量が上昇し、尿糖が出れば多尿になるのと同様、唾液量は増加する。
- 9、下肢末梢動脈疾患(PAD)のある患者へのケアで、下肢のマッサージを指導する場合、足底マッサージにつづき、ふくらはぎは末梢から中枢に向かってさする。

解答欄

1	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>		